Bimët endemike të florës vaskulare, karakteristike për Kosovën

Nr.	FAMILJA / Lloji	Lulëzimi / Frytet	Biotopi	Përhapja në Kosovë	Përhapja e përgjithshme	Bimë endemike	Zbulimi	Gjendja
	ARISTOLOCHIACEAE							
1	**Aristolochia merxmuelleri Greuter et Mayer 1985.** *(Petriku i Grojterit)*	IV / V-VI	Në terrene rërore – gurore pranë shkurreve, në substrate serpentinore të zones kodrinore - malore	Rajoni i Mirushës	Kosovë	e Kosovës	Greuter, W. & Mayer, E. (1985)	Populacione të zhvilluara mirë por me areal të kufizuar
	ASTERACEAE							
2	**Achillea alexandri – Regis Bornm. et Rud. 1934.** *(Barpezmi i mbretit Aleksandër)*	VII / VIII	Në vende barishtore dhe në pyllin e çetinakut (Achilleo – Pinetum mugi) të zones alpike në shkëmbinjë gëlqeror.	Malet e sharrit (Oshlak).	Kosovë	e Kosovës stenoendemike)	Bornmueller & Rudski, I. (1934), nga material ii mbledhur nga Malet e Sharrit	Populacione të zhvilluara mirë por me areal të kufizuar
3	**Centaurea albertii Rexhepi 1980.** *(Kokoçeli i Albertit)*	VI – VII / VIII - IX	Në vende shkëmbore dhe me bar të zones kodrinore deri në 1000 metra lartësi mbidetare, vetëm në substrate serpentine.	Devë Golesh.	Kosovë	e Kosovës (stenoendemike)	Rexhepi, F. (1980 (1977)), nga material ii mbledhur në Devë dhe Golesh.	Populacione të rrezikuara
	BORAGINACEAE							
4	**Cynoglossum krasniqii 1986.** *(Gjuhëqeni i Krasniqit)*	IV- VI / VI	Në vende shkëmbore – gëlqerore	Pashtrik (Gorozhup).	Kosovë	e Kosovës	Wraber, T. (1986).	!

Bimët endemike të florës vaskulare, karakteristike për Kosovën

	BRASSICACEAE							
5	**Bornmuellera dieckii Deg. 1900.** *(Bornmulera e Degenit)*	VI – VII / VIII	Në vende shkëmbore – serpentinore të zones malore dhe subalpike	Ostrovicë (1500 – 1900 m. lmb.	Kosovë	e Kosovës	Degen, A. (1900), në terrenet serpentinore në afërsi të Mushtishtit.	E rrallë
	CARYOPHYLLACEAE							
6	**Dianthus scardicus Wettst. 1892.** *(Karafili i Sharrit)*	VI – VII / VIII	Në vende shkëmbore dhe me bar të zonës subalpike dhe alpike	Malet e Sharrit (Luboten, Prevallc).	Kosovë	e Kosovës	Wettstein, R. (1892).	Populacione të rrezikuara
	CONVOLVULACEAE							
7	**Convolvulus cochlearis Griseb. 1844.** *(Dredhja e Kosovës)*	VI – VII / VIII	Në vende me bar dhe gurishtore të zones kodrinore me natyrë serpentine.	Gorancë (territori i Hanit të Elezit).	Kosovë	e Kosovës	Grisebach, A. 1844 (1843 – 1845), nga materiali I mbledhur në Kosovë.	E rrallë (bimë stenoendemike e Kosovës anda duhet domosdo të mbrohet me ligj)
	CRASSULACEAE							
8	**Sedum flexuosum Wettst. 1892.** *(Rrushqyqja e epshme)*	VI – VII / VIII	Në vende shkëmbore, sidomos gëlqerore, të zones subalpike	Malet e Sharrit (Luboten, Oshlak).	Kosovë	e Kosovës	Wettstein, R. (1892).	E rrallë
9	**Sempervivum kosaninii Praeger 1930.** *(Burgulli i Koshaninit)*	VII – VIII / IX	Në shkëmbinjë gëlqeror ose serpentinor të zones subalpike dhe alpike	Alpet Shqiptare.	Kosovë	e Kosovës	Praeger, L. (1930).	Duhet të mbrohet me ligj

Bimët endemike të florës vaskulare, karakteristike për Kosovën

	DIPSACACEAE							
10	**Cephalaria pastricensis Dorfl. et Hayek. 1921.** *(Cefalaria e Pashtrikut)*	VI – VII / VIII	Në vende me bar, shkurra, pyje të zones malorere dhe subalpike.	Pashtrik, Alpet Shqiptare (Bjeshkët e Lumbardhit, Zhleb).	Kosovë	e Kosovës	Dorfler, I., Hayek, A. (1921), nga materiali i mbledhur në Pashtrik dhe Alpet Shqiptare.	Populacione të rrezikuara (Duhet të jenë nën mbrojtje të ligjit)
	FABACEAE							
11	**Astragalus fialae Degen 1900.** *(Arithja e Fialit)*	VII / VIII	Në shkëmbinjë të zones alpike	Alpet Shqiptare (Bjeshkët e Lumbardhit).	Kosovë	e Kosovës	Degen, A. (1900), nga materiali I mbledhur në Alpet Shqiptare.	Populacione të rrezikuara (duhet të mbrohen me ligj).
12	**Trifolium wettsteinii Dorf. et Hayek 1921.** ***(Tërfili i Vetshtajnit)***	VII – VIII/ VIII - IX	Në kullosa subalpike dhe alpike	Pashtrik.	Kosovë	e Ballkanit	Dorfler, I., hayek, A. (1921), nga materiali i mbledhur në Pashtrik.	e rrallë (duhet të mbrohet me ligj)
	LAMIACEAE							
13	**Micromeria albanica (Griseb. ex K. Maly) Silic. 1979.** *(Bishtmiu shqiptar)*	VII – VIII / VIII – IX	Në vende shkëmbore – gëlqerore të zones kodrinore – malore	Gryka e Lumbardhit të Prizrenit.	Kosovë	e Kosovës	Grisebach, A. (1841).	e rrallë (duhet të mbrohet me ligj)
14	**Thymus albanus H. Braun 1892.** ***(Listra shqiptare)***	V – VI / VIII – IX	Në vende të thata, shkurre, kullosa, pyje të zones	Oshlak, Koritnik, Alpet	!	e Ballkanit	Braun, H. (1892).	Duhet të mbrohet me lig

			subalpike dhe alpike, posaqërisht në substrate gëlqerore	Shqiptare.				
15	**Thymus doerfleri Ronn. 1924.** *(Listra e Dorflerit)*	VI – VII / VIII – IX	Në vende të thata, pyje të rralla të zones malore subalpike	Koritnik.	Kosovë	e Kosovës	Ronninger, K. (1924), nga material ii mbledhur në Kosovë.	Populacione të pakëta (duhet të mbrohen me ligj)
16	**Thymus rochlenae Vel. 1903.** *(Listra e Rohlenes)*	VI / VII	Në kullosa, livadhe të zones malor dhe subalpike.	Oshlak, Rrethinat e Deçanit.	Kosovë	e Kosovës	Velenovsky, J. (1903).	Populacione të rrezikuara (duhet të mbrohen me ligj)
	LILIACEAE							
17	**Lilium albanicum Griseb. 1845.** *(Zambaku shqiptar)*	VI – VII / VII	Në vende të freskëta shkëmbore të zones malore - subalpike	Malet e Sharrit, Alpet Shqiptare.	Kosovë	e Kosovës	Grisebach, A. (1845) (1843 – 1845).	Duhet të jetë e mbrojtur meligj
18	**Stipa mayer Mart. 1971.** *(Pendëkaposhi i Mayerit)*	V – VI / VII	Në kullosa me natyrë serpentinore	Koznik, Rajoni i Mirushës, Godanc, Gllanasellë etj.	Kosovë	e Kosovës	Martiynovsky, (1971), nga material ii mbledhur më heret prej botanistit slloven E. Mayer, andaj edhe e ka marrë emrin e tij.	Duhet të mbrohet me ligj
	RANUNCULACEAE							
19	**Aconitum pentheri Hauek 1916.**	VII / VIII	Në vende me shkurre dhe me bar	Alpet Shqiptare	Kosovë	e Kosovës	Hayek, A. (1916).	Populacionet e saj janë të pakëta (duhet të jetë nën

	(Akoniti i Rusolisë)		të zones malore dhe subalpike	(Zhleb, Rusoli).				mbrojtje të ligjit)
	ROSACEAE							
20	**Potentilla calabra ten. 1811.** ***(Zorrëca e Kalabrisë)*** (bënë pjesë në grupin Potentilla argentea P. W. Ball.. Është lloj i ri për florën e Ballkanit (lloj endemik apenino – ballkanik) i konstatuar vetëm në lokalitetin Guri i Zi (Restelicë – Kosovë).	VII – VIII / VIII	Në shkëmbinjë acidicë me prejardhje vullkanike në lartësi mbidetare rreth 2000 m.	Malet e Sharrit (Guri i Zi (Restelicë – Kosovë).	Kosovë	e Kosovës	Tenore, M. (1811), Rexhepi, F. (1990 – 1997)	Populacione të rrezikuara (me që është specie me vetëm një loklitet në Siujdhesën Ballkanike, meriton kujdes dhe mbrojtje të posaqme, ngase populacionet e saj janë të rrezikuara dhe u kanoset rreziku i zhdukjes në gadishullin Ballkanik)
21	**Potentilla doerfleri Wettst. 1892.** *(Zorrëca e Dorflerit)*	VII – VIII / IX	Në vende me bar dhe shkëmbore të zones alpike.	Malet e Sharrit (Bistra, Maja e Zezë).	Kosovë	e Kosovës	Wettstein, R. (1892).	e rrallë (rritet në gr4upe pak a shiumë të mëdha, por është e rrallë dhe populacionet e saj janë të rrezikuara, andaj duhet të mbrohen me ligj)
22	**Rubus ipecensis rech. 1935.** *(Manaferra e Pejës)*	!	Në vende shkurrore serpentinore	Gubavc (Pejë)..	Kosovë	e Kosovës	Rechinger, K. H. (1935).	Populacione të rrezikuara (duhet të mbrohen me ligj)
	SAXIFRAGACEAE							
23	**Saxifrage scardica Griseb. 1843.** *(Iriqëza e Sharrit)*	VI – VIII / VIII – IX	Në shkëmbinjë të zones alpike	Koritnik, Alpet Shqiptare (Leqinak, Koprivnik etj).	Kosovë	e Kosovës	Grisebach, A. (1843) (1843 – 1845).	Populacione të rrezikuara (duhet të mbrohen me ligj)
24	**Verbascum scardicolum**	VII –	Në kullosa e shkurre	Malet e	Kosovë	e Kosovës	Bornmuller,	Populacione të rrezikuara

	Bornm. 1922. *(Barpeshku i Sharrit)*	VIII / VIII	të zones subalpike	Sharrit (Oshlak).	(vetëm në Kosovë)		J. (1922).	(duhet të mbrohen me ligj)
25	**Wulfenia blecicii Lak. 1971.** *(Vulfenia e Bleçiqit)* (Në kosovë janë të përhapura dy nënlloje të këtij lloji: W. blecicii subsp. blecicii dhe W. blecicii subsp. rohlenae, të cilat janë të përhapura në Alpet Shqiptare)	VI – VIII / VIII	Në vende me bar, pyje e shkurre të zones subalpike	Alpet Shqiptare.	Kosovë	e Kosovës	Lakusič, R. (1971)	!
	VIOLACEAE							
26	**Viola gracilis Sib. Et Smith. 1806.** *(Vjollca barishtore)*	VI – VII / VII	Në kullosa të zones alpike	Malet e Sharrit.	Kosovë	e Kosovës	Sibthorp, J., Smith, J. E. (1806) (1906 – 1813).	Lajmërohet në grupe të vogla ose të mëdha

Bimët endemike të florës vaskulare, karakteristike për Kosovën



Achilleo Aleksandri Regis



Aconitum pentheri



Stipas mayer



Potentilla dorfleri



Micromeria albanica



Convolvulus cochlearis